

AAA-aandoening bij senioren

(Aneurysma Aorta Abdominalis) is een levensbedreigende verwijding van de buikslagader. Jaarlijks sterven in Nederland minstens 1000 senioren door het scheuren van zo'n aneurysma! De Aortastichting wil dit zoveel mogelijk voorkomen door het bevorderen van preventief onderzoek en tijdige behandeling.


AAA-quickscan voor senioren

Met een eenvoudige echo-meting van de buikslagader kan meestal snel worden vastgesteld of er mogelijk sprake is van een aneurysma.

Met onze **AAA-quickscan-centra** maken wij het voor alle senioren in Nederland mogelijk om de aorta in de buik te laten meten.

Aortastichting &
AAA-quickscan-centra

www.aortastichting.nl



Volg ons op Facebook

Aneurysma van de buik-aorta

Normaal heeft de lichaamsslagader (aorta) in de buik een doorsnee tussen de 10 en 20 mm. Vanaf 30 mm spreekt men van een aneurysma (kortweg AAA genoemd). Deze AAA-aandoening komt boven de 60 jaar voor bij ongeveer 5% van de mannen en 1,5% van de vrouwen. Zo'n aneurysma is tot maximaal 50 mm meestal niet levensbedreigend. De toename van de verbreding bedraagt enkele mm per jaar. Bij een grotere diameter van het AAA, vanaf 50 mm (bij vrouwen) en vanaf 55 mm (bij mannen), is meestal het risico van preventief opereren lager dan het risico op een levensbedreigende bloeding.

Tijdbom in de buik

In Nederland lopen ruim 50.000 senioren rond met zo'n 'tijdbom' in hun buik zonder dit te weten. Door preventief onderzoek kan zo'n aneurysma eenvoudig worden ontdekt, zodat tijdige behandeling kan plaatsvinden.

AAA-quickscan voor senioren

Dit is een eenvoudige echo-meting van de buikslagader. Deze echografie is vooral bekend vanwege de toepassing bij zwangerschapscontrole. Hierbij wordt dezelfde techniek gebruikt om het ongeboren kind en de baarmoeder zichtbaar te maken. Een echo-onderzoek is volstrekt ongevaarlijk en u voelt er nauwelijks iets van. U ligt op een onderzoeksbank, waarbij alleen uw buik ontbloot hoeft te worden. Voor een goed meet-resultaat wordt een gel gebruikt als contact tussen de echo-kop en de buik. Om het onderzoek goed te kunnen verrichten, is het gunstig wanneer u tevoren bij voorkeur nuchter bent of hooguit een lichte maaltijd hebt gebruikt. Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier en u krijgt de resultaten direct mee om zonodig te bespreken met uw huisarts. De kosten zijn circa €40,- en worden momenteel (nog) niet door de ziektekostenverzekering vergoed.

In sommige gevallen (1 tot 2%) kan bij echografisch onderzoek de aorta niet of slecht worden gemeten, bij voorbeeld wegens aanwezigheid van darmgas of bij obesitas. In dat geval kunt u overleggen met uw huisarts om een verwijzing te krijgen naar een ziekenhuis om de aorta in de buik alsnog op een andere wijze te kunnen meten.

De AAA-quickscan-centra die deze metingen uitvoeren en aanvullende informatie vindt u op de website www.aortastichting.nl