

Oorzaak en verhoogde risico's op het krijgen van deze AAA-aandoening kunnen onder andere zijn: familiale belasting, (ex)rokers, hoge bloeddruk, hoog cholesterol en een ontstekingsreactie van de vaatwand.

Preventief AAA-onderzoek:

In de nieuwe Europese (2019)- en Nederlandse (2021) AAA-richtlijnen voor medisch specialisten wordt een **AAA-QuickScan** geadviseerd voor specifieke risicogroepen. Meerdere West Europese landen kennen al veel langer AAA-bevolkingsonderzoek en met name voor mannen vanaf 65 jaar. In Nederland wordt zo'n landelijke screening nog steeds niet van rijkswege gefaciliteerd.



Preventief echo-onderzoek AAA-QuickScan

AAA-QuickScan voor senioren:

Dit is een indicatieve echo-meting van de diameter van de buikslagader om te kijken of er mogelijk sprake is van een verwijding. Deze echografie is vooral bekend vanwege de toepassing bij zwangerschapscontrole. Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier en u krijgt de resultaten direct mee om zo nodig te bespreken met uw huisarts. Voor de AAA-QuickScan kunnen de senioren op eigen initiatief (low-cost) en zonder verwijzing in meerdere regio's terecht bij de echocentra waarmee de Aortastichting een samenwerkingsverband heeft. De kosten (ongeveer de helft van het ziekenhuistarief) zijn voor eigen rekening. De contactgegevens van deze echocentra staan vermeld op de website www.aortastichting.nl onder de rubriek "AAA-QUICKSCAN CENTRA".

Op deze website vindt u ook aanvullende informatie over de AAA-aandoening, over de AAA-QuickScan en het actuele low-cost tarief voor dit preventief onderzoek.